



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.

ministr zdravotnictví

V Praze, dne 20. června 2002

Č.j.: 13924/02

Vážený pane předsedo,

rád bych Vás informoval, že plénum Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví projednalo a posoudilo na svém zasedání dne 17.6.2002 aktuální stav devitalizace zhoubných nádorů metodou dr. Fortýna. Při svém jednání vycházelo ze závěrů jednání konaném na Akademii věd ČR dne 16.4.2002, ze stanovisek České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, České chirurgické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. Vědecká rada MZ konstatovala, že dosavadní experimentální výsledky i závěry proběhlých klinických zkoušek devitalizace zhoubných nádorů nedovolují pokračovat s ověřováním této léčebné metody u lidí.

V příloze Vám zasílám Vámi požadované výsledky devitalizačních operací metastazujícího kolorektálního karcinomu a metastazujícího maligního melanomu ze čtyř pracovišť pověřených Ministerstvem zdravotnictví klinickým ověřováním devitalizace.

S pozdravem

Příloha: 2 listy

Vážený pan  
Luboš Olejář  
Předseda svazu pacientů ČR  
Sokolská 32  
120 00 Praha 2

**Přehled výsledků devitalizačních operací  
metastazujícího kolorektálního karcinomu a  
metastazujícího maligního melanomu  
k datu 15. 6. 2002.**

**I. Metastazující kolorektální karcinom**

Na čtyřech pracovištích, *Chirurgické klinice FN Bulovka, I.Chirurgické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, v Institutu experimentální medicíny v Praze a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně,* pověřených MZ ČR klinickým hodnocením devitalizace metastazujícího kolorektálního karcinomu bylo touto metodou na základě schváleného protokolu a informovaného souhlasu nemocných v době od 1.3.2001 do 30.9.2001 **ošetřeno celkem 25 pacientů**, 9 žen a 16 mužů.

K 15. 6. 2002 již **zemřelo 20 (80%) pacientů**, 7 žen a 13 mužů . Doba přežívání pacientů se známým datem úmrtí se pohybovala v rozmezí 1-8 měsíců.

Dosud **přežívá 5 pacientů (20%)** (2 ženy a 3 muži) osm a více měsíců, z toho 3 s prokazatelnou progresí nádorového onemocnění, 1 pacientka při stabilizovaném nálezů jatrných metastáz a u 1 pacientky šlo o devitalizaci uzlinové metastázy zároveň s resekci primárního nádoru střeva a nové metastázy se dosud neobjevily.

V žádném devitalizační technikou operovaném případě nebyla zaznamenána regrese měřitelných vzdálených ložisek ani významné zlepšení kvality života.

Samotná devitalizační operace nebyla v žádném případě příčinou pooperačního úmrtí. **V 5 případech (20%) byla nutná léčba infekčních komplikací** v operované oblasti, včetně jedné operační revize pro zánět pobřišnice.

## II. Metastazující maligní melanom

Na třech pracovištích, *Chirurgické klinice FN Bulovka*, *Chirurgické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze* a v *Masarykově onkologickém ústavu v Brně*, pověřených MZ ČR klinickým hodnocením devitalizace metastazujícího maligního melanomu bylo touto metodou na základě schváleného protokolu a informovaného souhlasu nemocných v době od 1.3.2001 do 30.9.2001 **ošetřeno celkem 26 pacientů**, 11 žen a 15 mužů.

K 15.6.2002 bylo **možno hodnotit výsledky u 24 pacientů**, neboť 2 pacientky se po devitalizačním výkonu při další progresi nádorového onemocnění zjištěné po prvních kontrolách k dalším již nedostavovaly a nepodařilo se dohledat zda přežívají či nikoli. U jednoho pacienta byl devitalizační výkon proveden na jeho žádost dvakrát v intervalu dvou měsíců. Z hodnotitelných 24 případů již **21 (87%) pacientů zemřelo**, 8 žen a 13 mužů. Doba přežívání pacientů se známým datem úmrtí se pohybovala v rozmezí 1-11 měsíců.

Dosud **přežívají 3 nemocní (13%)** osm a více měsíců po operaci s progredujícím nádorovým onemocněním.

Pouze u 3 nemocných se podařilo prokázat dlouhodobější lokální regresi devitalizované metastázy a v jednom případě stabilizaci nálezu, avšak při progresi ostatních metastatických ložisek. V ostatních případech devitalizovaná ložiska persistovala nebo progredovala patrně živena částečně difuzí z okolní tkáně a periferní revaskularizací.

V žádném případě se nepodařilo prokázat regresi měřitelných vzdálených metastáz nebo významné zlepšení kvality života nemocných.

Samotné devitalizační operace metastáz maligního melanomu nebyly zatíženy závažnými komplikacemi, u 4 nemocných se objevil pooperační infekce v ráně řešený konzervativně.